

Cortinarius mucifluoides Henry

Forêt de Tronçais (F 03), sous feuillus, alt. 200 m, octobre 2013

En voyant ces chapeaux cannelés, ce pied discrètement violacé, visqueux comme le chapeau j'avais de prime abord pensé à *C. elatior*; un examen plus attentif, la lecture du chapitre consacré aux Myxaciium, dans l'Atlas des Cortinaires et finalement la confrontation avec les magnifiques planches 280 et 281 du même ouvrage devaient me convaincre qu'il s'agissait en fait de *C. mucifluoides*.

“Cortinarius elatior Fr. espèce rare qu'il ne faut pas confondre avec des formes de (...) C. mucifluoides “

C'est en ces termes, que R. Henry (1950) introduit la description de *C. mucifluoides*, que je résume ci dessous:

“Chapeau, 5-7 cm, de couleur extrêmement variable, avec les bords ridés, mais d'une façon inconstante (ridés -cannelés, cuticule chez les jeunes spécimens gris brun livide, isabelle-olivâtre, fauve- olivâtre, bistre ocracé olivâtre). Feuilletts incarnat pâle, crème argillacé, avec l'arête plus pâle et plus ou moins crénelée.. Stipe violeté pâissant, atténué en bas, parfois floconneux ou même écailleux, puis rapidement lisse, constamment strié en dessus de la cortine. Arête des lames présentant des cheilocystides en ballon.”

Microscopie :

Cuticule d'hypthes peu ramifiées, non bouclées, très septées, à terminaison parfois en ampoule. Cheilocystides en ballon jusque à 30 µm.

Dans l'Atlas des Cortinaires, pars X, ce taxon des Myxaciium est rangé dans les Cystidiosi , caractérisée par ses cystides en ballon, sous-section **mucifluoides** Bid. et al.



Cortinarius mucifluoides Henry





Remarques:

L'espèce figurée par Breitenbach et Kränzlin, dans le Tome V des champignons de Suisse N° 281 sous le nom de *C. livido-ocraceus* (Berk) Berk = *C. elatior* Fr. correspond probablement au taxon présenté ici. (Cf. Abbildungsverzeichnis Europäische Grosspilze, de Böllmann et al.)

L'Atlas des Cortinaires pars X et le chapitre consacré au sous-genre Myxacium me semble être incontournable si on veut tenter de démêler un peu l'écheveau des interprétations contradictoires qui gravitent au sein du sous-genre **Myxacium** section **Cystidiosi** PD Orton..




Cortinarius mucifluoides Henry



Cuticule: un ixocutis d'hyphes minces pluriseptées, non bouclées, peu ramifiées avec souvent des terminaisons ampullacées.
Les hyphes de *C. elatior* sont au contraire nettement plus ramifiées, parfois fourchues

Cortinarius mucifluoides Henry

Arête des lames



Cheilocystides en ballon., de
20-30 x 10-20 μm

Dimensions sporiques

10,1 [11,3 ; 12,2] 13,4 x 4,9 [5,6 ; 7,5] 10,2 μm

Q = 1,5 [1,6 ; 1,7] 1,8 ; N = 13 ; C = 95%

Me = 11,7 x 6,5 μm ; Qe = 1,6

Cortinarius mucifluoides Henry



Cortinarius mucifluoides Henry



Littérature consultée:

R. Henry, BSMF 66. p.156 , 1950

Marchand , Champignons du Nors et du Midi, tome 8, pPrpignan 1983

Bidaud & all. Atlas des Cortinaires, pars X, 2000 Lyon

Kibby & all. Field Mycology 10(2) p. 41, 2009

Cortinarius mucifluoides Henry



On notera les différences de couleur du chapeau et la discrète nuance violette du pied.